

# Calcul différentiel

## Continuité

### Exercice 1 (\*)

Étudier les limites en  $(0,0)$  des fonctions suivantes :

$$f(x,y) = \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 + y^2} \quad f(x,y) = \frac{xy(x+y)}{x^2 + y^2} \quad f(x,y) = \frac{x+2y}{x^2 - y^2} \quad f(x,y) = \frac{1 - \cos(xy)}{xy^2}.$$

### Exercice 2 (\*)

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + y^2 - 1 & \text{si } x^2 + y^2 > 1 \\ -\frac{x^2}{2} & \text{si } x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$ .

Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .

## Calcul différentiel

### Exercice 3 (\*)

Soit  $E$  un espace vectoriel euclidien, et  $f : x \mapsto \|x\|$ . En quels points cette application est-elle différentiable? Préciser le vecteur gradient en ces points.

### Exercice 4 (\*)

Soit  $E = \mathbb{R}_n[X]$  et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(P) = \int_0^1 P(t)^2 dt$ . Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et déterminer sa différentielle.

### Exercice 5 (\*)

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Montrer que  $f$  admet en  $(0,0)$  des dérivées partielles, mais que  $f$  n'est pourtant pas continue en ce point.

### Exercice 6 (\*)

Montrer que l'application  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x,y) = \frac{x^2 y^3}{x^2 + y^2} \text{ si } (x,y) \neq (0,0) \quad \text{et} \quad f(0,0) = 0$$

est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

### Exercice 7 (\*\*)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . On définit  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  par :

$$g(x,y) = \begin{cases} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} & \text{si } x \neq y \\ f'(x) & \text{sinon} \end{cases}$$

- Montrer que  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .
- On suppose  $f$  de classe  $\mathcal{C}^2$ . Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

### Exercice 8 (\*)

Soit  $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ , et  $f : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = \phi\left(\frac{y}{x}\right)$ .

Montrer que  $f$  vérifie la relation :  $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$ .

### Exercice 9 (\*\*)

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une application de classe  $\mathcal{C}^1$ .

a. On suppose que pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $f(x+t, y+t) = f(x, y)$ . Montrer que  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$ .

b. On suppose que pour tout  $t > 0$ ,  $f(tx, ty) = f(x, y)$ . Montrer que  $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$ .

### Exercice 10 (\*\*)

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une application non nulle de classe  $\mathcal{C}^1$ . On dit que  $f$  est *homogène* s'il existe une application  $\phi : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que :

$$(*) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda > 0, \quad f(\lambda x, \lambda y) = \phi(\lambda) f(x, y).$$

a. Montrer que si  $f$  est homogène, il existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que  $\forall \lambda > 0, \phi(\lambda) = \lambda^\alpha$ .

*Indication. Dériver l'égalité (\*) par rapport aux variables  $x, y$  et  $\lambda$ .*

b. Montrer alors que  $f$  est homogène si et seulement s'il existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y).$$

c. Résoudre cette équation aux dérivées partielles à l'aide des coordonnées polaires.

## Équations aux dérivées partielles

### Exercice 11 (\*)

Résoudre sur  $\mathbb{R}^2$  l'équation aux dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - 3 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$  en posant  $\begin{cases} u = 2x + y \\ v = 3x + y \end{cases}$ .

### Exercice 12 (\*)

En utilisant les coordonnées polaires résoudre l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + x^2 + y^2 = f(x, y).$$

### Exercice 13 (\*)

Résoudre sur  $\mathcal{U} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$  l'équation  $y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2f(x, y)$  à l'aide des coordonnées polaires.

### Exercice 14 (\*\*)

Résoudre sur  $\mathcal{U} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > y\}$  l'équation  $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x - y)f(x, y)$  en posant  $\begin{cases} u = x + y \\ v = xy \end{cases}$ .

### Exercice 15 (\*)

Résoudre sur  $\mathbb{R}^2$  l'équation  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$  en posant  $\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases}$ .

### Exercice 16 (\*)

Étant donné  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  on considère l'équation aux dérivées partielles

$$a \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

où la fonction  $f$  est supposée de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

- Transformer l'équation par le changement de variables  $u = x + \alpha y$  et  $v = x + \beta y$ .
- Lorsque  $b^2 - 4ac > 0$  montrer qu'on peut intégrer l'équation.

### Exercice 17 (\*\*)

Résoudre sur un ouvert adéquat l'équation  $x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$  en posant  $\begin{cases} u = xy \\ v = x/y \end{cases}$ .

### Exercice 18 (\*\*)

On appelle *laplacien* de  $f$  la quantité  $\Delta f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ . Calculer-le en coordonnées polaires. Quels sont les fonctions *harmoniques* (c'est-à-dire vérifiant  $\Delta f = 0$ ) et *isotropes* (ne dépendant pas de l'angle  $\theta$ )?

## Extremums d'une fonction

### Exercice 19 (\*)

Déterminer la valeur maximale sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]^2$  de  $f : (x, y) \mapsto \sin x \sin y \sin(x + y)$ .

### Exercice 20 (\*)

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = x^2 + x^2 y + y^3$ .

- Montrer que  $f$  admet un point critique qui n'est pas un extremum local.
- Soit  $\mathcal{K} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ . Déterminer les extremums de  $f$  sur  $\mathcal{K}$ .

### Exercice 21 (\*)

a. Soient  $x, y$  et  $z$  trois nombres réels positifs. Montrer qu'il est possible de construire un triangle dont les côtés sont de longueurs respectives  $x, y$  et  $z$  si et seulement si :

$$x < y + z, \quad y < z + x, \quad \text{et} \quad z < x + y.$$

b. Un triangle variable a un périmètre  $p$  imposé, ses côtés ont pour longueur  $x, y$  et  $z$ .

On pose  $F(x, y, z) = (x + y)^2 + (y + z)^2 + (z + x)^2$ . Déterminer le triangle pour lequel  $F(x, y, z)$  est minimal, et donner la valeur de ce minimum.

### Exercice 22 (\*\*\*)

Déterminer le périmètre maximal d'un triangle inscrit dans un cercle de rayon  $R$ .

## Applications géométriques

### Exercice 23 (\*)

On considère la surface d'équation :  $2(xz + yz) + x + 2y + z - 1 = 0$ .  
Déterminer son intersection avec son plan tangent en  $(0, 0, 1)$ .

### Exercice 24 (\*)

Soit  $\mathcal{S}$  la surface d'équation cartésienne  $z^2 - x^2 - y^2 = 1$ .

On considère la droite  $\mathcal{D}$  d'équations  $(2x + y = 0, z = 0)$ . Déterminer les points  $M$  de  $\mathcal{S}$  tels que le plan tangent à  $\mathcal{S}$  en  $M$  soit parallèle à  $\mathcal{D}$ .