

PERMUTATIONS ALTERNANTES MONTANTES (CENTRALE PC 2019)

Durée : 4 heures

Le sujet est composé de trois parties.

Dans la partie I, on définit une suite $(\alpha_n)_n$ d'entiers naturels via le développement en série entière d'une fonction auxiliaire et on s'intéresse en particulier à la suite extraite $(\alpha_{2n+1})_n$ formée des termes de rang impair.

Dans la partie II, on détermine un équivalent, lorsque n tend vers l'infini, de α_{2n+1} en faisant appel à des outils analytiques et notamment la fonction zêta de Riemann.

Dans la partie III, on définit les permutations alternantes puis on procède à leur dénombrement.

La partie II fait appel, très ponctuellement, à des résultats de la partie I. La partie III utilise des résultats des parties I et II.

I Introduction d'une fonction auxiliaire

Soit l'intervalle $I =]-\pi/2, \pi/2[$. On considère la fonction f définie sur I par

$$\forall x \in I, \quad f(x) = \frac{1 + \sin x}{\cos x}$$

On note $f^{(n)}$ la dérivée d'ordre n de f et, par convention, $f^{(0)} = f$.

I.A – Dérivées successives

Q 1. Exprimer les dérivées f' , f'' et $f^{(3)}$ à l'aide des fonctions usuelles.

Q 2. Montrer qu'il existe une suite de polynômes $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à coefficients réels telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, \quad f^{(n)}(x) = \frac{P_n(\sin x)}{(\cos x)^{n+1}}$$

On explicitera les polynômes P_0, P_1, P_2, P_3 et, pour tout entier naturel n , on exprimera P_{n+1} en fonction de P_n et P'_n .

Q 3. Justifier que, pour tout entier $n \geq 1$, le polynôme P_n est unitaire, de degré n et que ses coefficients sont des entiers naturels.

Q 4. Montrer

$$\forall x \in I, \quad 2f'(x) = f(x)^2 + 1$$

Pour tout entier naturel n , on pose $\alpha_n = f^{(n)}(0) = P_n(0)$.

Q 5. Montrer $2\alpha_1 = \alpha_0^2 + 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2\alpha_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha_k \alpha_{n-k}$$

I.B – Développement en série entière

On note R le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\alpha_n}{n!} x^n$ et g sa somme.

Q 6. On rappelle l'égalité de Taylor avec reste intégral : si h est une fonction de classe $N+1$ sur le segment $[a, b]$ alors

$$f(b) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n + \int_a^b \frac{(b-t)^N}{N!} f^{(N+1)}(t) dt.$$

À l'aide de ce résultat, montrer

$$\forall N \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, \pi/2[, \quad \sum_{n=0}^N \frac{\alpha_n}{n!} x^n \leq f(x)$$

Q 7. En déduire la minoration $R \geq \pi/2$.

Q 8. Montrer

$$\forall x \in I, \quad 2g'(x) = g(x)^2 + 1$$

Q 9. Montrer

$$\forall x \in I, \quad f(x) = g(x)$$

Indication : considérer les fonctions arctan f et arctan g .

Q 10. En déduire que $R = \pi/2$.

I. C – *Partie paire et partie impaire du développement en série entière*

Q 11. Justifier que toute fonction $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de façon unique sous la forme $h = p + i$ avec $p : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction paire et $i : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction impaire.

Q 12. En déduire

$$\forall x \in I, \quad \tan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha_{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad \text{et} \quad \frac{1}{\cos x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha_{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

On note t la fonction définie sur I par $t(x) = \tan(x)$.

Q 13. Pour tout entier naturel n , exprimer $t^{(n)}(0)$ en fonction des réels $(\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}}$.

Q 14. Rappeler, sans justification, l'expression de t' en fonction de t .

Q 15. En déduire

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \alpha_{2n+1} = \sum_{k=1}^n \binom{2n}{2k-1} \alpha_{2k-1} \alpha_{2n-2k+1}$$

II Équivalent de α_{2n+1}

II. A – *La fonction zêta*

Pour tout $s > 1$, on pose $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

Q 16. Montrer que ζ est continue sur $]1, +\infty[$.

Q 17. Justifier que $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s) = 1$.

Q 18. Déterminer $C(s)$ tel que

$$\forall s \in]1, +\infty[, \quad \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k-1)^s} = C(s)\zeta(s)$$

II. B – *Une formule pour la fonction cosinus*

Pour tout entier naturel n et tout réel x , on pose $I_n(x) = \int_0^{\pi/2} \cos(2xt)(\cos t)^n dt$.

Q 19. Montrer

$$\forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket, \forall x \in \mathbb{R}, \quad \left(1 - \frac{4x^2}{n^2}\right) I_n(x) = \frac{n-1}{n} I_{n-2}(x) \quad \text{et} \quad \left(1 - \frac{4x^2}{n^2}\right) \frac{I_n(x)}{I_n(0)} = \frac{I_{n-2}(x)}{I_{n-2}(0)}$$

Q 20. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin(\pi x) = \pi x \frac{I_{2n}(x)}{I_{2n}(0)} \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right)$$

Q 21. En déduire

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, 1[, \quad \cos(\pi x) = \frac{I_{4n}(2x)}{I_{4n}(0)} \frac{I_{2n}(0)}{I_{2n}(x)} \prod_{p=1}^n \left(1 - \frac{4x^2}{(2p-1)^2}\right)$$

II. C – *Un autre développement de tangente*

Dans toute cette sous-partie II.C, on pose $J =]0, 1/2[$ et, pour tout entier naturel n et tout réel x de J ,

$$S_n(x) = \sum_{p=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{2^{2p+1} x^{2p-1}}{(2k-1)^{2p}} \right)$$

Q 22. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall s \in]1, +\infty[, \quad \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(2k-1)^s} \leq \frac{1}{2(s-1)} \frac{1}{(2n-1)^{s-1}}$$

Q 23. Justifier que, pour tout entier naturel n , la fonction S_n est définie sur J .

Q 24. Montrer que la suite (S_n) converge simplement sur J vers la fonction nulle.

Q 25. En dérivant $x \mapsto \ln(\cos(\pi x))$, montrer

$$\forall x \in J, \quad \pi \tan(\pi x) = -\frac{2I'_{4n}(2x)}{I_{4n}(2x)} + \frac{I'_{2n}(x)}{I_{2n}(x)} + \sum_{k=1}^n \frac{8x}{(2k-1)^2} \frac{1}{1 - \frac{4x^2}{(2k-1)^2}}$$

Q 26. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in J, \quad \pi \tan(\pi x) + S_n(x) = -\frac{2I'_{4n}(2x)}{I_{4n}(2x)} + \frac{I'_{2n}(x)}{I_{2n}(x)} + \sum_{p=1}^{+\infty} 2(2^{2p}-1)\zeta(2p)x^{2p-1}$$

Q 27. Montrer l'inégalité $t \cos t \leq \sin t$, pour tout $t \in [0, \pi/2]$.

Q 28. En déduire

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq -I'_n(x) \leq \frac{4x}{n} I_n(x)$$

puis, pour $x \in [0, 1]$, la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I'_n(x)}{I_n(x)}$.

Q 29. En déduire l'égalité

$$\forall x \in J, \quad \pi \tan(\pi x) = \sum_{p=1}^{+\infty} 2(2^{2p}-1)\zeta(2p)x^{2p-1}$$

II. D – Un équivalent de α_{2n+1}

Q 30. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \alpha_{2n+1} = \frac{2(2^{2n+2}-1)(2n+1)!}{\pi^{2n+2}} \zeta(2n+2)$$

Q 31. En déduire un équivalent de α_{2n+1} lorsque n tend vers l'infini.

III Permutations alternantes

Soit n un entier supérieur ou égal à 2 et soit (x_1, x_2, \dots, x_n) une liste de n nombres réels. On dit que la liste (x_1, \dots, x_n) est alternante montante si $(-1)^i(x_i - x_{i-1}) > 0$ pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$. On dit qu'elle est alternante descendante si $(-1)^i(x_i - x_{i-1}) < 0$ pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$.

Autrement dit, la liste (x_1, \dots, x_n) est alternante montante si elle vérifie les inégalités $x_1 < x_2 > x_3 < x_4 > \dots$. Elle est alternante descendante si elle vérifie les inégalités inverses.

Par exemple, $(1, 5, 3, 11, 8, 9)$ est alternante montante car $1 < 5 > 3 < 11 > 8 < 9$ et $(7, 4, 5, 2, 12)$ est alternante descendante car $7 > 4 < 5 > 2 < 12$.

On dit qu'une permutation σ de l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$ est alternante montante (respectivement alternante descendante) si la liste $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ est alternante montante (respectivement alternante descendante).

Par exemple, avec $n = 7$ et en représentant toute permutation σ par la liste des images $(\sigma(1), \dots, \sigma(7))$, on constate que $(1, 5, 4, 6, 2, 7, 3)$ représente une permutation alternante montante et $(3, 2, 6, 4, 7, 1, 5)$ une permutation alternante descendante.

III. A – Dénombrement des permutations alternantes

Q 32. Déterminer les permutations alternantes montantes de $\llbracket 1, n \rrbracket$ pour $n = 2, n = 3, n = 4$.

Q 33. Montrer, pour tout $n \geq 2$, que le nombre de permutations alternantes montantes est égal au nombre de permutations alternantes descendantes.

Si $n \geq 2$, on note β_n le nombre de permutations alternantes montantes de $\llbracket 1, n \rrbracket$ et on convient que $\beta_0 = \beta_1 = 1$.

Q 34. Soient k et n deux entiers tels que $2 \leq k \leq n$ et A une partie à k éléments de $[[1, n]]$. On considère les listes (x_1, \dots, x_k) constituées de k éléments deux à deux distincts de A . Montrer que le nombre de ces listes qui sont alternantes montantes est égal à β_k .

Le nombre de celles qui sont alternantes descendantes est le même, mais on ne demande pas de le justifier.

Q 35. Montrer, pour tout entier $n \geq 1$: $2\beta_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \beta_k \beta_{n-k}$.

Indication : pour $k \in [[0, n]]$, dénombrer les permutations σ alternantes (montantes ou descendantes) de $[[1, n+1]]$ telles que $\sigma(k+1) = n+1$.

Q 36. En déduire que $\beta_n = \alpha_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

III. B – Permutations aléatoires

Pour tout entier $n \geq 2$, on munit l'ensemble Ω_n des permutations de $[[1, n]]$ de la probabilité uniforme. On note p_n la probabilité qu'une permutation dans Ω_n soit alternante montante. On convient de plus que $p_0 = p_1 = 1$.

Q 37. Montrer que la suite (p_n) tend vers 0. Donner un équivalent de p_{2n+1} quand n tend vers l'infini.

On définit une variable aléatoire M_n sur Ω_n en associant à toute permutation $\sigma \in \Omega_n$ l'entier $M_n(\sigma)$ tel que :

- $M_n(\sigma) = 2$ si $\sigma(1) > \sigma(2)$;
- $M_n(\sigma) = 3$ si $\sigma(1) < \sigma(2) < \sigma(3)$;
- $M_n(\sigma) = 4$ si $\sigma(1) < \sigma(2) > \sigma(3) > \sigma(4)$;
- ...
- $M_n(\sigma) = n+1$ si σ est alternante montante.

En d'autres termes, $M_n(\sigma) = k+1$ où k est le plus grand entier tel que $(\sigma(1), \dots, \sigma(k))$ soit alternante montante.

On note $\mathbb{E}(M_n)$ l'espérance de M_n .

Q 38. Pour tout $i \in [[0, n]]$, montrer $\mathbb{P}(M_n > i) = p_i$.

Q 39. Exprimer $\mathbb{E}(M_n)$ en fonction de p_0, p_1, \dots, p_n . En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(M_n) = \frac{\sin(1) + 1}{\cos(1)}$.